

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

MIKRODERMOBRAZJA

Przeciwwskazania bezwzględne

- Zakażenia bakteryjne np: liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa;
- Zakażenia wirusowe, np.: brodawki, opryszczka, mięczak zakaźny;
- Zakażenia grzybicze oraz drożdżakowe;
- Trądzik krostkowy, ropowiczy, trądzik różowaty;
- Występowanie uszkodzeń i ciągłości skóry;
- Nowotwory skóry i znamiona;
- Naczyniaki jamiste;
- Stosowanie terapii izotretynieą wymaga przynajmniej 3 – 6 miesięcznej karencji po zakończeniu kuracji; kwalifikacja do zabiegu – wymagana jest konsultacja dermatologiczna;
- Stosowanie leczenia sterydami, hormonami;
- Skłonność osobnicza do powstawania bliznowców;
- Wykonane zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy wymagają przerwy do 2 miesięcy od ich wykonania;
- Inne przeciwwskazania medyczne;

Przeciwwskazania względne:

- Ciąża, karmienie piersią;

KWASY

MIGDAŁOWY, PIROGRONOWY, AZALAINOWY, SALICYLIOWY ORAZ INNE Z GRUPY KWASÓW AHA, BHA, PHA, KWAS FITOWY

RETINOL

- Infekcje skórne w fazie aktywnej (opryszczka)
- Zapalenie tkanki łącznej, podrażniona skóra
- Ciąża i karmienie piersią
- Grzybica łuszczyca
- Chemioterapia
- Skłonność do powstania bliznowców
- Duża ilość znamion melanocytowych
- Leczenie retinoidami w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- Nadwrażliwość na składniki receptury preparatów badanych i uzupełniających
- Przerwanie ciągłości naskórka
- Zakaz opalania (słońce solarium) podczas stosowania preparatów a po zakończeniu serii zabiegów minimum miesiąc od zakończenia kuracji.

Względne

- Ciąża, karmienie piersią
- Atopowe zapalenie skóry
- Łuszczyca

ZABIEGI ELEKTROTERAPEUTYCZNE stosowane w gabinecie:

GALWANIZACJA

JONOFOREZA

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI- PRĄDY D'ARSONWALA

Przeciwwskazania ogólne do wykonania wyżej wymienionych zabiegów

- Nowotwory oraz okres 5 – 10 lat od chwili wyleczenia. Zabieg w gabinecie może być wykonany z pisemną zgodą lekarza prowadzącego,
- Uszkodzenia skóry w miejscu zabiegu,
- Stany zapalne pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybicze skóry w miejscu zabiegu,
- Choroby skóry, w których wspomniane zabiegi mogą wpływać negatywnie (faza zaostrzenia trądziku pospolitego przebiegająca z ropnymi wykwitami, faza zaostrzenia trądziku różowatego),
- Leczenie retinoidami,
- Liczne teleangiektazje i skłonności do ich powstawania
- Niewyrównana cukrzyca
- Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
- Zakrzepowe zapalenie żył i tętnic, żylaki
- Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych (np.: Układowe zapalenia naczyń, np. guzkowe zapalenie tętnic, Toczeń rumieniowaty układowy, Sarkoidoza, Cukrzyca, Nadciśnienie tętnicze, Zespół metaboliczny, AIDS)
- Nadciśnienie tętnicze
- Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego i inne choroby serca oraz niezdiagnozowane dolegliwości ze strony układu krążenia
- Gruźlica
- Stany podgorączkowe, przeziębienie
- Ciąża, karmienie piersią

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA /FRAKCYJNA/

- Miejscowe stany zapalne skóry – infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze;
- Skóra źle tolerująca iniekcje, nakłucia;
- Przyjmowanie przez dłuższy okres leków przeciwzakrzepowych;
- Choroby ogólnoustrojowe (metaboliczne, nowotwory, zaburzenia neurologiczne, itd.);
- Skłonność do bliznowacenia;
- Cukrzyca;
- Ciąża, karmienie piersią;
- Alergia;
- Cera naczyniowa;
- Stosowanie terapii izotroteiną. Kwalifikacja do zabiegu po zakończeniu leczenia wraz z konsultacją dermatologiczną;

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – ELEKTROPORACJA Połączenie wysokonapięciowego jednokierunkowego prądu impulsowego o częstotliwości radiowej z ultradźwiękami, jako dodatkowego czynnika wspomagającego wnikanie substancji.

- Ciężki ogólny stan i wyniszczenie
- Choroby nowotworowe i okres od 5 do 10 lat od ich wyleczenia. Zabieg w gabinecie może być wykonany z pisemną zgodą lekarza prowadzącego.
- Bakteryjne, grzybicze, wirusowe choroby skór w miejscu wykonywania zabiegu, w tym również zakażenie opryszczki)
- Ostre i przewlekłe procesy infekcyjne w całym organizmie
- Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych
- Choroby skóry, w których ultradźwięki mogą wpływać negatywnie (faza zaostrzenia trądziku pospolitego przebiegająca z ropnymi wykwitami, faza zaostrzenia trądziku różowatego),
- Liczne teleangiektazje i skłonności do ich powstawania,
- Uszkodzenia mechaniczne skóry w miejscu zabiegu,
- Zaburzenia funkcji układu krążenia, szczególnie jego niewydolność oraz istotne zaburzenia krążenia tętniczego i pracy serca,
- Wszczepiony rozrusznik serca i inne implanty elektroniczne (istnieje możliwość zakłócenia ich pracy),
- Zakrzepowe zapalenie żył i tętnic, żylaki,
- Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, sterydowych, hormonalnych
- Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienności mięśnia sercowego i inne choroby serca oraz niezdiagnozowane i nieleczone dolegliwości ze strony układu krążenia.
- Niewyrównana cukrzyca
- Gruźlica
- Infekcje jamy ustnej, szczególnie ropne zapalenia dziąseł i zębów
- Ekstrakcja zębów.
- Protezy zębowe, aparaty ortodontyczne
- Zabiegów nie powinno wykonywać się po terapii wypełniaczami tkankowymi i bezpośrednio po terapii toksyną botulinową.
- Spastyczne porażenie mięśni
- Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych (np.: Układowe zapalenia naczyń, np. guzkowe zapalenie tętnic, Toczeń rumieniowaty układowy, Sarkoidoza, Cukrzyca, Nadciśnienie tętnicze, Zespół metaboliczny, AIDS)
- Indywidualna wrażliwości skóry i organizmu na zabiegi elektroterapii
- Cięża, karmienie piersią